

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Aciclovir Creme - 1 A Pharma®

Wirkstoff: Aciclovir

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* beachten?
3. Wie ist *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen



1. Was ist *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* und wofür wird sie angewendet?

Aciclovir Creme - 1 A Pharma ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Virusinfektionen (Virostatikum).

Anwendungsgebiete:

Zur lindernden Behandlung von Schmerzen und Juckreiz, bei häufig wiederkehrenden Herpesinfektionen mit Bläschenbildung im Genital- und Lippenbereich (rezidivierender Herpes genitalis und labialis).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* beachten?

Aciclovir Creme - 1 A Pharma darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Aciclovir oder einen der sonstigen Bestandteile von *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* sind.

Sie dürfen *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* nicht auf Schleimhäute (z. B. in der Mundhöhle, am Auge oder in der Scheide) auftragen, da sonst mit örtlichen Reizerscheinungen zu rechnen ist.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* ist erforderlich

Bei der Behandlung mit *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* im Genital- oder Analbereich kann es wegen der Hilfsstoffe Paraffin und Vaseline bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Falls bei Ihnen eine schwere Störung der körpereigenen Immunabwehr vorliegt, sollten Sie Ihren Arzt vor Behandlungsbeginn darauf hinweisen.

Bei Anwendung von *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anzuwenden bzw. vor kurzen eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

3. Wie ist *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* anzuwenden?

Wenden Sie *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* immer genau nach der Anweisung des Arztes an. Bitte Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Tragen Sie die Creme 5-mal täglich alle 4 Stunden auf die infizierten Hautbereiche dünn auf.

Art der Anwendung

Tragen Sie *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* mit einem Wattestäbchen auf, das mit einer für die Größe der infizierten Hautbereiche notwendigen Menge bestrichen wird. Achten Sie beim Auftragen darauf, dass Sie nicht nur die bereits sichtbaren Anzeichen des Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung) mit der Creme bedecken, sondern dass Sie auch angrenzende Bereiche in die Behandlung mit einbeziehen.

Falls Sie das Auftragen mit den Fingern vornehmen, sollten Sie diese vorher und nachher intensiv reinigen, um eine zusätzliche Infektion der geschädigten Hautpartie (z. B. durch Bakterien) bzw. eine Übertragung der Viren auf noch nicht infizierte Schleimhaut- und Hautbereiche zu verhindern.

Besonderer Hinweis

Um einen größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollten Sie *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* bereits bei den ersten Anzeichen der Herpeserkrankung (Brennen, Jucken, Spannungsgefühl und Rötung) anwenden.

Dauer der Anwendung

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 5 Tage. Im Einzelfall führen Sie die Behandlung so lange durch, bis die Bläschen verkrustet oder abgeheilt sind. Sie sollten jedoch eine Behandlungsdauer von 10 Tagen nicht überschreiten.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie die Anwendung von *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* vergessen haben

Setzen Sie die Behandlung wie verordnet fort. Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben (tragen Sie die Creme z. B. nicht häufiger oder dicker auf).

Wenn Sie die Anwendung von *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* abbrechen

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* ausreichend lange anzuwenden (siehe auch "Art und Dauer der Anwendung").

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, oder unbekannt

Mögliche Nebenwirkungen

Nach dem Auftragen von *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* kann vorübergehendes Brennen oder Stechen an den behandelten Hautabschnitten auftreten.

Rötung, Eintrocknung, Juckreiz und Abschuppung der mit *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* behandelten Haut wurden gelegentlich beobachtet.

Selten wurde nach Anwendung von *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* vom Auftreten einer allergischen Hautreaktion (Kontaktdermatitis) berichtet. Wurden allergologische Untersuchungen durchgeführt, erwiesen sich in den meisten Fällen die Hilfsstoffe der Creme-Grundlage und nicht der Wirkstoff Aciclovir als Ursache der Hautreaktion.

Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen, dass die oben genannten Nebenwirkungen ver-

stärkt auftreten und über die mit Creme behandelten Hautabschnitte hinausgehen. In diesem Fall sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* aufzubewahren?

Aufbewahrungsbedingungen

Bewahren Sie *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* nicht unter 8 °C auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Hinweise auf die Haltbarkeit nach Anbruch

Sie können die geöffnete Tube bei sachgemäßer Aufbewahrung bis zum Ablauf des Verfalldatums verwenden.

6. Weitere Informationen

Was enthält *Aciclovir Creme - 1 A Pharma*:

1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir.

Die sonstige Bestandteile sind: Cetylalkohol (Ph.Eur.), Dimeticon 350, Glycerolmonostearat, dickflüssiges Paraffin, Macrogolsteart 1500, Propylenglycol, weißes Vaseline, gereinigtes Wasser

Wie *Aciclovir Creme - 1 A Pharma* aussieht und Inhalt der Packung:

Aciclovir Creme - 1 A Pharma ist eine weiße bis gedeckt weiße, homogene Creme.

Aciclovir Creme - 1 A Pharma ist erhältlich in Originalpackungen mit 2 g (N1), 5 g (N1) und 20 g (N3) Creme.

Pharmazeutischer Unternehmer

1 A Pharma GmbH
Kaltenring 1 + 3
82041 Oberhaching
Telefon: (089) 6138825-0

Hersteller

Salutas Pharma GmbH
Lange Göhren 3
39171 Osterweddingen

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im

September 2009

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!
1 A Pharma GmbH wünscht gute Besserung!