

Solidago comp. Heel

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung: 1 Ampulle zu 2 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Juniperus communis Dil. D2 2 mg, Oleum terebinthinae (HAB 1934) Dil. D6 [HAB, Vorschrift 5a, Lösung D1 mit Ethanol 86 % (m/m)] 2 mg, Helleborus (HAB 34) Ø [HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)] 2 mg, Berberis Ø 2 mg, Apocynum Dil. D1 2 mg, Petroselinum Dil. D1 2 mg, Sarsaparilla Dil. D2 2 mg, Solidago virgaurea Dil. D2 2 mg.

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Darreichungsform und Inhalt:

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Originalpackungen mit 10 und 100 Ampullen zu 2 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden

Telefon: 07221-50100, Telefax: 07221-501690

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Bei Überempfindlichkeit gegen Solidago virgaurea oder andere Korbblütler darf Solidago comp. Heel nicht eingenommen werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Siehe unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise."

Was ist bei Kindern zu beachten? Siehe unter "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise."

-Heel



Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Solidago comp. Heel in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen? Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, 2-3-mal wöchentlich 2 ml Injektionslösung intramuskulär oder intravenös injizieren.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit die Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht längere Zeit angewendet werden.

Nebenwirkungen: Keine bekannt.

Hinweise: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Nach Ablauf des auf Ampulle und Faltschachtel angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Stand der Information: 12/2004

